

毛髪治療薬（男性用） 同意書

<プロペシア（フィナステリド）>

男性における男性型脱毛症のみの適応で、進行を遅延する効果があります。

1日1回、服用してください。効果が確認できるまで数か月間程かかることがあります。副作用として食欲不振、全身倦怠感、抑うつ症状、勃起不全、性欲減退、精液量の減少、精液の質の低下、肝機能障害、アレルギー症状などがあります。また未成年の方は服用を控えて頂いております。

- 本剤を服用中の患者様では、前立腺癌検査で測定される PSA という検査値が約 50%低下するので、評価の際には注意が必要です。検査の際には、担当医療機関に服用していることをお知らせください。
- 本剤を服用中の方は献血できません。献血をする場合は、服用中止または終了後1ヶ月間空けてください。服用時には定期的に血液検査で肝機能をチェックさせていただきます。肝機能の採血は初回購入時、その後は服用から半年毎に行います。健康診断や他院で定期的に採血されている方はデータの提示をよろしくお願いいたします。それ以外の方は当院で採血させていただきます。データの提示、当院での採血に同意いただけない場合は、薬剤副作用に対する責任は負いかねますのでご了承ください。また一旦処方させていただいた薬の返品、返金はできませんのでご了承下さい。
- 採血は1回 1500円 別途頂戴いたします。

取扱いの注意事項

- ・ 本剤を割って服用しないでください。
- ・ 本剤が粉碎・破損した場合、妊娠中、授乳中、妊娠の可能性のある方は取り扱わないでください。
- ・ 本剤を妊婦に投与すると、本剤の薬理作用（DHT 低下作用）により、男子胎児の生殖器官等の正常発育に影響を及ぼすおそれがございます。
- ・ 本剤はコーティングされているので、割れたり砕けたりしない限り、通常の手扱いにおいて有効成分に接触することはありません。
- ・ また、プロペシア錠を割って服用した場合の安全性や有効性も確立されておりません。
- ・ 外用薬 ロゲイン 5%(男性用)ミノキシジルという成分の男性用薬用発毛剤です。壮年性脱毛症における発毛・育毛および、脱毛(抜け毛)の進行予防に効果的です。毛細血管を拡張させ、頭皮の血流を促し、発毛を促進させます。発赤、かゆみ、一時的な抜け毛の増加、むくみ、動悸、めまいなどが生じることも可能性がございます。
- ・ 妊娠中、授乳中、妊娠の可能性のある方、未成年の方は使用しないでください。血圧異常の方は使用を控えていただく場合がございます。

私は上記治療について説明を受け内容理解し、該当医薬品を購入することに同意いたします。

年 月 日 氏名